

Les violences conjugales : Conséquences gynécologiques et obstétricales

Dr Anne-sophie Maisonneuve
Gynécologue Obstétricien CH Aubagne

Lundi 4 novembre 2019


Les différentes formes de violences conjugales

- = violences perpétrées dans la sphère intime du couple par l'un des partenaires
- > 98 % des cas l'auteur est un homme
- Physiques
- Sexuelles
- Psychologiques



Cycle de la violence

- Tension/ agression/ excuses-justifications/ réconciliation/ retour au quotidien
- Evolution en spirale : escalade intensité et fréquence
- Délits et crimes avec circonstances aggravantes



Cycle de la violence Source : Gigandet et Mosczytz, 2006

Quelques chiffres

- OMS :

- 1/3 des femmes en couple ont déjà subies des violences de la part de leur partenaire
- 1/5 sera victime de viol ou tentative de viol dans sa vie

- En France :

- 219 000 femmes victimes de leur partenaire ou ex/an (*INSEE-ONDRP-SSMSI, Enquête Cadre de vie et sécurité, 2012-2018*)
- 62 000 femmes sont victimes de viols ou tentative/an (*Ined, enquête Virage 2015*)

→ Répercussions sur la santé à court ou long terme
Recours aux soins



Les difficultés rencontrées

- Repérage des femmes victimes de violence non faite et les conséquences traumatiques physiques et psychiques sur la santé non reconnues
- Pourquoi ?
 - espace familial considéré comme protecteur,
 - femme est anesthésiée émotionnellement
 - Déni : honte, culpabilité
 - Loi du silence
 - mémoire et dissociation traumatique
 - **méconnaissance** de la réalité de ces violences et de leurs conséquences, et absence de formation des professionnels




Rapport Pr Henrion 2001

- Incidence majeure sur la santé des femmes :
 - Blessures provoquées
 - Affections chroniques
 - Troubles très variés



Figure 2. Les conséquences de la violence au sein du couple sur la santé



Source :
OMS,
2013

Conséquences gynécologiques à court terme



- Lésions traumatiques : plaies vaginales, périnéales
- Infections génitales récidivantes, IST
- Grossesse non désirée, IVG (IVG itératives)
- Fausses couches précoces 14% vs 10%

Increased risk of miscarriage among women experiencing physical or sexual intimate partner violence during pregnancy in Guatemala City, Guatemala: cross-sectional study, Johri et al, 2011

Conséquences gynécologiques à moyen et long terme (1)



- Somatisation
- constante chez les personnes en amnésie post-traumatique
- Troubles somatiques multiples :
 - Douleurs
 - Troubles fonctionnels
 - Troubles lésionnels

Conséquences gynécologiques


A moyen et long terme (2)

- Douleurs
 - Douleurs pelviennes chroniques
 - Dysménorrhées, syndromes prémenstruels
 - Dyspareunies
- Troubles sexuels : vaginisme, anorgasmie
- Modifications neuro biologiques ⇒ dysfonctionnement hypothalamo-hypophysaire :
 - troubles du cycle : aménorrhée I ou II
 - Infertilité I ou II (centre de PMA)
- Insuffisance lutéale : mastodynie, fibrome précoce, polype utérin
- Dysménorrhée par Endométriose
- Maladies auto immunes



Conséquences gynécologiques

A moyen et long terme (3)



- Endométriose :
 - severe physical abuse (RR = 1.20; 95% CI = 1.06, 1.37)
 - severe sexual abuse (RR = 1.49; 95% CI = 1.24, 1.79).
- ↗ lésions cervicales précancéreuses,
- ↗ cancer du col : OR = 2.6, 95% CI = 1.7-3.9.
- ↗ cancer du sein (violence sexuelle + violence physique)

Early life abuse and risk of endometriosis Holly R Harris, and all Stacey A Missmer *Human Reproduction*, Volume 33, Issue 9, Sept 2018
Violence against Women Raises Risk of Cervical Cancer. Coker AL¹, J Womens Health (Larchmt). 2009 Aug;18(8):1179-85.
Abuse victimization and risk of breast cancer in the Black Women's Health Study Wise LA , *Cancer Causes Control* 2011

Violences et grossesse

- Période à risque : facteur déclenchant (40%) ou aggravant
- Risque x 2 pdt grossesse
- Risque x 3 si grossesse non désirée.
- 2 vies en jeu

Epidémiologie :

- OMS 6-15% des femmes victimes de violences physiques ou sexuelles pdt grossesse, dans la majorité des cas par leur conjoint.
- Europe : 3-8%



Levée des amnésies traumatiques tant pour les futures mères que pour les futurs pères

Conséquences Obstétricales (1)

- Toutes les violences ont des impacts sur la femme et sur le fœtus
- Conséquences directes : coups directs sur l'abdomen (64% des cas) ou à des traumatismes sexuels



- Conséquences indirectes : comportement maternel (addictions tabac, drogues, alcool, manque de suivi, mauvaise alimentation, le stress, mauvaise estime de soi, manque de soutien par le partenaire)

Conséquences Obstétricales (2)

Rapport Pr Henrion 2001 ENVEFF

- Grossesse non désirée → IVG, déclarations tardives, grossesse mal suivies
- IVG refusée ou exigée par le conjoint
- Conduites addictives
- Ne cs pas ou cs trop pour des motifs multiples (douleurs)
- ↗ Risque de prématurité
- ↗ RCIU
- ↗ HRP, ↗ MIU
- Fractures anténatales de membres décrites
- Perturbation du lien mère enfant : angoisse, malaise de la mère, difficulté d'allaitement

Conséquences Obstétricales (3)

Intimate partner violence victimization prior to and during pregnancy among women residing in 26 U.S. states : Associations with maternal and neonatal health , Sylverman J, Am J Gyn Obst, vol. 195, 2006

- ↗ métrorragies (+ 90%),
- ↗ RPM (+ 60 %)
- ↗ les infections urinaires
- ↗ vomissements incoercibles,
- ↗ diabète (+48%)
- ↗ HTA (+40 %)
- ↗ prématurité (+ 37 %)
- ↗ hypotrophie (+21 %)

Conséquences Obstétricales (4)

Prevalence and health effects of intimate partner violence and non-partner sexual violence WHO 2013

Domain	Disease/injury resulting from violence	Definition	Search date	Number of studies identified	Effect size (95% CI) ^a
Perinatal health	Low birth weight	< 2500 g	June 2012	13	aOR = 1.16 ^g (1.02 to 1.29)
	Premature birth	Gestational age < 37 weeks	June 2012	10	aOR = 1.41 ^g (1.97 to 2.60)
	Small for gestational age	Birth weight below the 10th percentile	June 2012	3	aOR = 1.36 ^g (0.53 to 2.19)

Conséquences Obstétricales (4)

Méta analyse (50 études) : évaluation de l'impact des violences conjugales sur la prématurité, les RCIU ou les PAG, en fct du type de violence

- 5 087 388 patientes dont 14 906 victimes de violences (17 pays /6 continents)
- **Prématurité** : OR 1.91, 95% CI 1.60–2.29
- **RCIU** : OR 2.11, 95% CI 1.68–2.65
- **PAG** : OR 1.37, 95% CI 1.02–1.84




Figure 3. Graphical representation of violence type effect estimates.

Intimate partner violence during pregnancy and the risk for adverse infant outcomes: a systematic review and meta-analysis BM Donovan, CN Spracklen, ML Schweizer, KK Ryckman, AF Saftlas Published Online 9 March 2016. BJOG

Conclusion

- Relation entre l'exposition à la violence et les problèmes de santé des femmes
- Conséquences gynécologiques des violences sont fonctionnelles et organiques
- Grossesse :
 - période à risque
 - risques maternels et fœtaux
- Etudes européennes +++
- Eveiller les consciences des médecins, et de tous les soignants sur le sujet des violences
- Inviter les patientes à mettre du sens sur leurs symptômes
- Travail en réseau

« Il y a une vérité universelle, applicable à tous les pays, cultures et communautés : la violence à l'égard des femmes n'est jamais acceptable, jamais excusable, jamais tolérable. »

Ban Ki-moon, Secrétaire général des Nations Unies (2008)