

**VIOLENCES FAITES AUX FEMMES**

**STOP**

**UNE JOURNÉE DE SENSIBILISATION  
POUR LES PROFESSIONNELS ET LE GRAND PUBLIC**

**4 NOVEMBRE 2019**  
13H30 - 22H00

**LES DIVERSES VIOLENCES  
FAITES AUX FEMMES  
LES MOYENS DE LUTTE**

MIEUX CONNAÎTRE L'IMPACT DES VIOLENCES CONJUGALES, DES  
MUTILATIONS SEXUELLES, SUR LA SANTÉ DES FEMMES ET DES ENFANTS :  
QUEL ACCOMPAGNEMENT MÉDICAL, SOCIAL, JURIDIQUE ET JUDICIAIRE  
SUR L'AIRE AUBAGNAISE ?

ORGANISÉ PAR  
**Gynécologie  
Sans  
Frontières**

Nombre limité de places - Inscription gratuite mais obligatoire  
auprès de Gynécologie Sans Frontières: [colloquevdfm.aubagne@gmail.com](mailto:colloquevdfm.aubagne@gmail.com)

# Violences conjugales Conséquences sur les enfants

## Session 1

**MÉCANISMES DES VIOLENCES  
CONJUGALES ET SES CONSÉQUENCES  
SUR LES FEMMES ET LES ENFANTS**



Dr Emmanuelle BOSDURE

Dr Violaine BRESSON

**80% des enfants sont présents au moment des actes de violence**  
**40% subissent des violences physiques directes**  
**4 millions d'enfants sont exposés à la violence**

En 2016:

38 enfants étaient présents sur le lieu de l'homicide

88 enfants sont devenus orphelins

25 enfants ont été tués

L'exposition à la violence est une forme de mauvais traitement

- Maltraitance physique
- Maltraitance psychologique

Ayant des conséquences pouvant être graves sur son développement

**Loi du 14.03.2016 : violence conjugale = situation qui permet de considérer que le mineur est en danger ou en risque de danger**


→ Réalisation d'une information préoccupante lorsqu'elles sont repérées

# Maltraitance foétale?

La grossesse est une période particulièrement à risque

- D'apparition
- D'aggravation

Des violences conjugales



**Violences physiques sur la femme enceinte : accouchement prématuré, MIU ...**

**Consommation de toxiques : alcool, cannabis, autres drogues  
Consommation médicamenteuse / anxiété ou syndrome dépressif**

**Négligence maternelle  
Déni de grossesse**

## Retentissement psychologique

Estime de soi / Difficultés d'adaptation  
Troubles de l'attachement

Altération de la relation mère/enfant :  
perte de la relation « maternelle »

Eclatement des « routines » :  
Repas, bains, coucher..

Altération du cadre éducatif

## Relations familiales

# Violences conjugales au domicile

Enfant témoin  
Enfant victime  
Enfant bouclier

Stratégies ayant pour objectifs de


- Prévenir les violences
- Maîtriser les violences
- Donner sens aux violences

Retentissement social

Retentissement organique

Etat de stress post-traumatique

Schéma erroné de la pensée



# Violences post-séparation



Représailles et vengeances,  
Rétablissement de la situation de pouvoir et de contrôle  
Tentative de forcer une réconciliation

- Au Canada, violences conjugales après la séparation :
  - 61% violences anciennes
    - 37% continuation / 24% aggravation
  - 39% violences ont commencé après la séparation
- D'autres études confirment qu'en cas de violences conjugales, les violences post séparation sont plus sévères
  - Violences physiques, psychologiques et sexuelles
  - Touchent aussi les enfants
  - Instrumentalisation des enfants +++
  - Risque majeur de fémicide après séparation : x 5

# Signes d'alerte

Fonction de l'âge

Doivent alerter

- Les cliniciens
- Tous les intervenants



BEBES	ENFANTS D'ÂGE PRESCOLAIRE	CLASSES PRIMAIRES 5-12 ANS	DEBUT DE L'ADOLESCENCE 12-14 ANS	FIN DE L'ADOLESCENCE 15-18 ANS
Retard staturo-pondéral	Actes d'agression	Brutalité à l'égard des autres	Violence y compris à l'égard des personnes fréquentées	Violence y compris à l'égard des personnes fréquentées
Inattention	Dépendance	Agressivité générale	Brutalité	Abus d'alcool
Perturbation des habitudes d'alimentation et de sommeil	Anxiété	Dépression	Manque d'estime de soi	Abus drogues
Retards du développement	Cruauté envers les animaux	Anxiété	Suicide	Désertion du foyer
Symptômes du ESPT*	Actes de destruction de biens	Repli	Absentéisme scolaire	Fugue
	Symptômes du ESPT*	Comportement oppositionnel	Problèmes somatiques	Baisse soudaine des résultats
		Destruction de biens	Manque de respect à l'égard des femmes ; convictions stéréotypées à l'égard du rôle des hommes et des femmes	Baisse de la fréquentation scolaire
		Mauvais résultats scolaires	Manque de respect à l'égard des femmes ; convictions stéréotypées à l'égard du rôle des hommes et des femmes	Suicide
		Manque de respect à l'égard des femmes ; convictions stéréotypées à l'égard du rôle des hommes et des femmes	Symptômes du ESPT*	Manque de respect à l'égard des femmes ; convictions stéréotypées à l'égard du rôle des hommes et des femmes
		Symptômes du ESPT*		Symptômes du ESPT*

# Etat de stress post-traumatique

Exposition à la violence

Stress extrême + réponse émotionnelle incontrôlable

Mécanisme reflexe « protecteur » : sécrétions endorphines SNC

Anesthésie psychique et physique

Troubles de la mémoire : amnésie et mémoire traumatique émotionnelle

Etat dissociatif : conscience altérée, dépersonnalisation, être spectateur de soi même..

Revivre la scène traumatique (+/- déformée) : flash-backs (en pensée ou en cauchemars)

Symptômes d'évitement et « d'engourdissement émotionnel » : situations, lieux, personnes...

= phobie, TOC

= Recours à des produits dissociant (alcool, drogue); à des conduites à risque ...

Symptômes d'hyper-vigilance malgré absence de danger imminent

# Schéma erroné de la pensée de l'enfant

La violence est une manière de résoudre des conflits.

La violence est acceptable dans la relation entre un homme et une femme.

La violence fait partie de l'intimité.

La violence peut être minimisée voire niée.

La violence est une manière de gérer la frustration.

La violence permet d'obtenir ce que l'on veut.

Conséquences sur le développement et la construction de l'enfant

Rapport à la violence

Relation avec ses pairs

Relation avec les femmes

0-24 mois : moment clé des apprentissages



Troubles alimentaires : repas tendus, conflits RGO

Sommeil : horaire inadapté, entrecoupé  
Endormissement difficile ou agité  
Réveils nocturnes réguliers  
**= retentissement sur les apprentissages**

Absence de volonté d'exploration  
Pas de déplacement / Retard de la marche  
Enfant trop calme, triste, babille peu



Retard staturo-pondéral

Inattention

Perturbation des habitudes d'alimentation et de sommeil

Retards du développement

Symptômes du ESPT\*

ENFANTS D'ÂGE  
PRESCOLAIRE

Actes d'agression



Hétéro-agressivité scolaire, au parc.. / auto-agressivité

Dépendance



Recherche de contact, d'affection sans discernement, trouble attachement

Anxiété



**Anxiété sans explications claires au niveau familial (pas de deuil... ) :**

Cruauté envers les animaux

Actes de destruction de biens

Cauchemars, difficultés endormissement

Isolement, repli sur soi

Pleurs inexplicables

Balancement répétitif du corps

Symptômes du ESPT\*



**ATTENTION : à ne pas négliger**



Crainitif, hyper-vigilance

Signes cliniques non spécifiques : énurésie secondaire  
Plaintes somatiques multiples

**Signes non spécifiques  
= signes évocateurs de maltraitance de l'enfant**

*Cf recommandation HAS*

CLASSES PRIMAIRES  
5-12 ANS

Brutalité à l'égard des autres

Agressivité générale

Dépression

Anxiété

Repli

Comportement  
oppositional

Destruction de biens

Mauvais résultats  
scolaires

Manque de respect à  
l'égard des femmes ;  
convictions  
stéréotypées à l'égard  
du rôle des hommes  
et des femmes

Symptômes du ESPT\*

Hétéro-agressivité ++  
Opposition  
Intolérance à la frustration  
Accès de rage non justifiée  
Réaction inappropriée

Signes non spécifiques  
= signes évocateurs de maltraitance de l'enfant

*Cf recommandation HAS*

**Anxiété sans explications claires au niveau familial (pas de deuil... ) :**  
Cauchemars, difficultés endormissement  
Isolement, repli sur soi, non participation aux activités (scolaire ou extra-scolaire)  
Pleurs inexplicables, labilité émotionnelle

Recherche de contact, d'affection sans discernement

**Retentissement scolaire +++**

**Signe d'alerte important très évocateur**



DEBUT DE  
L'ADOLESCENCE  
12-14 ANS

Violence y compris à l'égard des personnes fréquentées

Brutalité

Manque d'estime de soi

Suicide

Absentéisme scolaire

Problèmes somatiques

Manque de respect à l'égard des femmes ; convictions stéréotypées à l'égard du rôle des hommes et des femmes

Symptômes du ESPT\*

Tout changement marqué du comportement ou de l'état émotionnel non expliqué par une situation exprimée par la famille (deuil..) ou une cause médicale

**Accès de violence : hétéro-agressivité / auto-agressivité (scarifications)**

Troubles du sommeil  
Comportement régressif

**Tentative de suicide, mise en danger  
Réseaux sociaux**

**Retentissement scolaire +++**

Plaintes variées : douleurs abdominales, céphalées, troubles somatoformes ...

**Signe d'alerte important très évocateur**



**FIN DE  
L'ADOLESCENCE  
15-18 ANS**

Tout changement marqué du comportement ou de l'état émotionnel non expliqué par une situation exprimée par la famille (deuil..) ou une cause médicale

Violence y compris à l'égard des personnes fréquentées

**Accès de violence : hétéro-agressivité / auto-agressivité (scarifications)**

Abus d'alcool

Abus drogues

**CONDUITE A RISQUE +++ = signe de mal-être toujours**

Désertion du foyer

Fugue

Troubles du sommeil  
Comportement régressif

A l'inverse : refus de sortir, pas de relation amicale  
= protection maternelle

Baisse soudaine des résultats

Tentative de suicide, mise en danger  
Réseaux sociaux

Baisse de la fréquentation scolaire

**Retentissement scolaire +++**

Suicide

Manque de respect à l'égard des femmes ; convictions stéréotypées à l'égard du rôle des hommes et des femmes

**Signe d'alerte important très évocateur**

Symptômes du ESPT\*



# Signes physiques


- Consécutives aux violences physiques sur la mère :
  - Enfant bouclier
  - Nourrisson dans les bras d'un parent
- Violences intentionnelles sur l'enfant


Toute fracture chez un nourrisson < 1 an qui n'a pas acquis la marche

Toute intoxication médicamenteuse ou d'autres substances chez un nourrisson < 9 mois

Toutes ecchymoses ou hématomes chez un nourrisson < 9 mois

Une histoire clinique qui ne correspond pas aux signes cliniques constatés  
Une explication accidentelle qui n'est pas plausible / l'absence d'explication  
Le retard d'accès aux soins  
L'absence de suivi médical ou l'errance médicale





**HEMATOMES / ECCHYMOSES : sont suspects de maltraitance :**

Thorax, dos, siège, organes génitaux, face postérieure de la cuisse, oreilles, angles de la mâchoire, lèvre supérieure, mastoïde, nuque, épaules, bras et face dorsale des mains symétriquement


Frein de la langue ou des lèvres (gavage coercitif)

Cou (marque de strangulation)

Face antérieure des avant-bras (protection contre les coups)



**FRACTURES** : Toute fracture chez un NRS < 1 an  
Lésions métaphysaires, cotes postérieures, omoplate, Épineuse vertébrale, sternum  
Fractures multiples d'âge différents



**BRULURES volontaires** : sont profondes, circonscrites reproduisant l'agent vulnérant, profondes en périphérie

# Violences sexuelles

- En post séparation, d'après les résultats de nombreuses études l'un des principaux facteurs de risque d'agressions sexuelles de la part du père est la violence conjugale contre la mère (Fleming, Mullen, & Bammer, 1997 ; Humphreys, Houghton, & Ellis, 2008)
- Allégations par un des deux parents / peu d'allegations directes par les enfants
- Signes d'alerte non spécifiques
- Examen clinique souvent normal
- Nécessité d'une évaluation systématique
- Mesures de protection

# Conséquences à l'âge adulte

Conséquences	Facteur de risque
Tabagisme	x 2
Dépression durant plus de 2 semaines	x 4,6
Tentatives de suicide	x 12,2
Alcoolisme	x 7,4
Maladie sexuellement transmissible	x 2,5
Cancer	x 1,9
Broncho-pneumopathie chronique obstructive	x 3,9
Hépatite	x 2,5
État de santé précaire	x 2,2
Obésité sévère	x 1,6
Absence d'activités physiques de loisir	x 1,3
Toxicomanie	x 4,7
Toxicomanie parentérale <sup>8</sup>	x 10,3
Agressions	x 2,4
Diabète	x 1,6
Fractures	x 1,6
> 50 partenaires sexuels	x 3,2

Conséquences de l'exposition à quatre événements de vie pendant l'enfance  
(n = 9 508 sur 13 494) Source : Felitti, 1998

# Conclusion


Situations malheureusement fréquentes

Conséquences immédiates et à long terme pour le parent victime ET POUR l'enfant

**Le repérage systématique des violences au sein du couple est indispensable pour le/la professionnel.le afin qu'il-elle puisse :**

- ✓ Poser un diagnostic correct.
- ✓ Identifier et hiérarchiser les besoins de l'enfant et de la mère victime.
- ✓ Définir les priorités de son action et élaborer avec l'enfant et la femme victime un projet individuel adapté.
- ✓ Orienter vers des partenaires internes ou externes pour assurer une prise en charge globale.

On a tous un rôle à jouer



Mission interministérielle pour la protection des femmes contre les violences  
et la lutte contre la traite des êtres humains  
(MIPROF)